



BENTA® 480 SL

Une solution pour le désherbage des Maïs, Sorgho, Graminées et Légumineuses fourragères

Sélectif de vos cultures de graminées fourragères ou de légumineuses fourragères, pures ou en mélanges.

Usage	Cultures couvertes	Doses homologuées	Stade d'emploi
Maïs, Maïs doux *Désherbage	Maïs grain, Maïs fourrage, Maïs doux, Millet, Moha et Miscanthus	2,5 L/ha	Jusqu'à BBCH35
Sorgho*Désherbage	Sorgho	2,5 L/ha	-
Graminées fourragères*Désherbage	Cultures de Ray-Grass, Fétuque, Dactyle, Brome et Fléole destinées à l'alimentation animale.	2,5 L/ha au printemps	BBCH 10-19
		2,1 L/ha à l'automne	BBCH 10-39
Légumineuses fourragères*Désherbage	Cultures de Trèfle blanc*, Trèfle violet* et Luzerne destinées à l'alimentation animale	2,5 L/ha au printemps	BBCH 10-19
		2,1 L/ha à l'automne	BBCH 10-39

* Traiter à partir du stade 2-3 vraies feuilles (trifoliées) du Trèfle et de la Luzerne. L'usage sur Trèfle Incarnant reste sous la responsabilité de l'utilisateur.

Un spectre très large et très adapté :

Facilite l'installation des cultures fourragères
et
Maintient la productivité de vos cultures fourragères.

	Dicotylédones	
	stade jeune	stade dvlpé
alchemille		
betterave		
capselle		
carotte		
colza		
érodium		
géranium		
matricaire		
mourens		
moutarde		
ravenelle		
stellaire		
vesce		
amarante		
anthémis		
chenopode		
datura		
érigéron		
lampsane		
morelle		
verveine		

	Dicotylédones	
	stade jeune	stade dvlpé
abutilon		
arroche		
fumeterre		
laiteron		
lamiers		
lampourde		
mercuriale		
renouée f. patience		
renouée liseron		
renouée persicaire		
séneçon		

Particulièrement efficace sur **Renoncule, Matricaires** et **Sanves** qui perturbent l'installation des cultures.
Très efficace sur **Morelle** et **Datura** qui peuvent se révéler toxiques pour le bétail.



Grow a better tomorrow.

3 bonnes raisons de traiter tôt sur prairies

- ✓ + 30% de rendement sur la première coupe si un herbicide a été appliqué pour faciliter l'installation (synthèses des essais Chambre d'Agriculture du Finistère)
- ✓ Meilleure efficacité quand les adventices sont jeunes
- ✓ Très peu de solutions disponibles sur prairies installées

Benta® 480 SL doit être utilisé sur une culture en bon état végétatif, avec des conditions météorologiques adaptées :

- température inférieure à 25°C
- pas de fortes amplitudes thermiques
- pas de gelées dans les 10 jours après application

- ✓ Appliquer Benta® 480 SL sur végétation sèche, avec une hygrométrie cependant suffisante pour assurer l'efficacité du produit (minimum 70%).
- ✓ Une période sans pluie de 5 à 6 heures qui suivent le traitement est nécessaire pour permettre l'action du produit.
- ✓ Privilégier des volumes d'eau par hectare importants (de l'ordre de 400 L/ha) pour le traitement pour optimiser la couverture des adventices ciblées.
- ✓ L'utilisation en mélange avec une huile minérale est déconseillée.

Recommandations – Mesures pour la protection des ressources en eau

- Pour tous les usages : ne pas dépasser 1000 g/ha/an de bentazone (soit 2,1L de Benta® 480 SL)
- Pour les usages « fourragères », traiter en dehors des périodes de recharge en eau
 - En automne, avant le 25 septembre sur des cultures jeunes semées en fin d'été
 - En automne, avant le 15 octobre sur des cultures installées
 - Au printemps, après le 15 mars et sur sols ressuyés
- Sur les zones de captage (pour toutes les cultures sur lesquelles le produit est autorisé) :
 - Ne pas appliquer sur les sols dont le taux de matière organique est < 1,7%
 - Ne pas appliquer sur les sols sensibles aux transferts (sols superficiels ou sols avec nappes peu profondes)

- > Composition : bentazone 480 g/L
- > Formulation : SL
- > N° d'AMM : 2120160

- > Classement :  - Attention - H302 H317 H319 H410

- > ZNT : 5m
- > DAR : Maïs fourrage, Maïs grain, Maïs doux: 28 jours
Sorgho, Millet Moha Miscanthus: 90 jours
- > DRE : 48 heures

© Marque déposée et détenteur de l'AMM SHARDA Europe BVBA – Heedstrat, 58-1730, ASSE – 1730 – Belgique
Nufarm SAS - 28 bd Camélinat 92230 Gennevilliers - tel: 01 40 85 50 50 - fax: 01 47 92 25 45. www.nufarm.com - Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto> - Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi se référer à l'étiquette du produit et / ou www.phytodata.com.



Grow a better tomorrow.